



Avícola

BRNCOSECRETOLÍTICOS

BROMHEXOL® NF

Bromhexina 0,30 g, Guaifenesina 2 g, Eucaliptol 7 g
Broncosecretolítico y expectorante para aves y cerdos - Administración Oral.

BENEFICIOS:

- ✓ Asegura tres acciones directas y efectivas: expectorante, mucolítico y mucocinético.
- ✓ Ejerce acción antiespasmódica.
- ✓ Perfecta relación sinérgica con tratamientos antibióticos.

INDICACIONES:

BROMHEXOL®NF está indicado como coadyuvante en todas las enfermedades respiratorias, severas, agudas o crónicas, que cursen con secreción de moco y con aumento de su viscosidad, sean de naturaleza infecciosa o no.

Aves: Coadyuvante en casos de Coriza Infecciosa, Pasteurella, Enfermedad Respiratoria Crónica y reacciones Post-vacunales virales como New Castle, Bronquitis Infecciosa, Influenza, Mycoplasmosis, entre otras.

Cerdos: Coadyuvante en casos de Neumonía en general, Pleuroneumonía Porcina, Neumonía enzoótica Porcina, Rinitis Alérgica, Rinitis secas, Sinusitis, Tos Mecánica por polvo de alimento, Catarros, entre otras.

BROMHEXOL®NF se puede administrar asociado con algunos antibióticos, siempre que la naturaleza de la enfermedad respiratoria sea infecciosa, a criterio del médico veterinario.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

BROMHEXOL®NF se debe administrar por vía oral en el agua de bebida o por aerosol, por un período de 3 - 5 días de tratamiento.

•En el Agua de Bebida:

Aves: 0,5 mL - 1,0 mL de **BROMHEXOL®NF** por L de agua.

Lechones: 5 mL - 10 mL de **BROMHEXOL®NF** / Lechón / día.

Cerdos: 15 mL - 20 mL de **BROMHEXOL®NF** / Cerdo / día.

•Vía Aerosol:

Aves: Utilice 250 mL de **BROMHEXOL®NF** para 20 L de agua.
Realice una aspersión diaria durante 3 - 5 días.

Usar bajo recomendación y criterio del médico veterinario.



PRESENTACIONES:
Garrafa x 1 galón,
1 L y 20 L