



HEMOPARASITICIDA

# DIACEGAN®-OXI

Diminazene Diaceturato 43.75 mg - Oxitetraciclina 115 mg - Antipirina 190 mg  
Hemoparasitica para bovinos, equinos, ovinos, caprinos y caninos.

## BENEFICIOS:

- ✓ Eficaz contra los hemoparásitos, aún en casos de resistencia a otros compuestos.
- ✓ Actúa en bovinos, ovinos, equinos y caninos.
- ✓ Actúa rápidamente después de su aplicación.
- ✓ Es muy seguro. Se utiliza en animales muy jóvenes o débiles.
- ✓ Viene listo para ser usado.
- ✓ Es de amplio espectro eliminando completamente los hemoparásitos.
- ✓ **DIACEGAN®-OXI** contra Ranilla Blanca (*Anaplasmosis*), Ranilla Roja o Fiebre de Garrapata (*Babesiosis*) y Renguera o Mal de Caderas (*Tripanosomosis*).
- ✓ Por su contenido de *Oxitetraciclina* actúa contra *Anaplasmosis* y posibles infecciones bacterianas existentes.

## INDICACIONES:

**DIACEGAN®-OXI** está indicado en bovinos, equinos, ovinos y caninos para el control y tratamiento de *Anaplasmosis* (por la acción de la *Oxitetraciclina*), *Babesiosis* y *Tripanosomosis*. (También *Trichomoniasis*).

**Bovinos:** *Anaplasma marginale*, *Tripanosoma vivax*, *Babesia bovis*, *Babesia bigemina*.

**Equinos:** *Tripanosoma evansi*, *Babesia equi*, *Babesia caballi*.

**Ovinos:** *Babesia ovis*, *Anaplasma marginale*, *Anaplasma ovis*.

**Caninos:** *Babesia canis*, *Babesia gibsoni*.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

3.5 mg/kg de peso corporal de *Diminazene Diaceturato*.

8 mg/kg de peso corporal de *Oxitetraciclina*.

En la práctica:

ESPECIE	DOSIS DIACEGAN®-OXI
Bovinos	4 mL/50 kg
Equinos	4 mL/50 kg
Ovinos y Caprinos	2 mL/25 kg
Caninos	1 mL/12.5 kg

Aplicar por vía intramuscular profunda.

Una sola aplicación es suficiente, si persiste la fiebre a las 24 horas, repetir la administración.

PRESENTACIONES:  
Frasco x 25 mL y  
Frasco x 50 mL

## TIEMPO DE RETIRO:

No destinar la leche para consumo humano hasta 6 días después del tratamiento.

No sacrificar los animales hasta 22 días después del tratamiento.

