

# MÓDULO ANTIBACTERIANO



Avícola

ANTIBACTERIANO

## NORFLAVIC®

Norfloxacin soluble al 20% - Antibacteriano y antimicoplásmico de amplio espectro para aves - Administración oral.

### BENEFICIOS:

- ✓ Quinolona de segunda generación con espectro antibacteriano y antimicoplásmico.
- ✓ Solución con estabilizadores de pH para mayor solubilidad y resistencia a degradación por la luz.
- ✓ Con dosis pulsátiles se logran concentraciones estables.
- ✓ Excelente absorción intestinal.
- ✓ Incrementa su concentración tisular provocando una mayor sensibilidad de la acción de los macrófagos.
- ✓ Excelente desempeño en presencia de aguas duras y en un rango amplio de pH.
- ✓ Mejor biodisponibilidad comparada con norfloxacin base.
- ✓ Tratamiento seguro y económico.

### INDICACIONES:

En **aves**, para el tratamiento de procesos infecciosos ocasionados por: *Escherichia coli*, *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma synoviae*, *Avibacterium paragallinarum*, *Pasteurella multocida*, *Gallibacterium anatis* (antes *Pasteurella haemolytica*), *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella spp*, *Proteus spp* y en cuadros de enteritis, septicemia, aerosaculitis, salpingitis, reacciones postvacunales complicadas (ERCC) y en situaciones de estrés.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

10 - 20 mg de principio activo (Norfloxacin) por k.p.v. por día, durante 3 - 5 días.

También se puede ajustar la dosis así:

1 - 2 ml de **NORFLAVIC®** por cada 4 L de agua, por 3 - 5 días como única fuente de bebida.

Usar bajo recomendación y criterio del médico veterinario.



PRESENTACIONES:

Frasco x 1 L